

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Пихтоина
для лечения ран, ожогов, травматических повреждений тканей, экзем, дерматитов,
бурситов, маститов, ушибов, папиллом и язв у животных
(организация-разработчик: ПАО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Пихтоин® (Pichtoinum).

Международное непатентованное название: живица сосновая.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Пихтоин содержит в 100 г в качестве действующего вещества живицу сосновую - 20 г, а в качестве вспомогательных веществ: воск пчелиный или вошину - 8 г, мел химически осажденный - 10 г и масло индустриальное – до 100 г. Пихтоин представляет собой однородную мазь от светло-желтого до коричневого цвета.

3. Пихтоин выпускают расфасованным по 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 100; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800; 900 г и 1 кг в банках стеклянных с навинчиваемыми крышками или в банках полимерных, укупоренных крышками с контролем первого вскрытия, или по 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 200 г в тубах полимерных. Каждая упаковка снабжена инструкцией по применению.

4. Пихтоин хранят в закрытой упаковке, в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 30 °С. Срок годности Пихтоина при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания срока годности.

5. Пихтоин следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний кожи.

Пихтоин оказывает комплексное противовоспалительное, антимикробное и регенерирующее действие.

Живица сосновая, входящая в состав Пихтоина, за счет наличия флавоноидов и фитонцидов обеспечивает антисептические свойства препарата.

При нанесении на кожу Пихтоин проникает через сальные железы и частично межклеточные ходы. В железах и межклеточных ходах биологически активные компоненты живицы переходят в растворимое состояние и постепенно всасываются, способствуя расширению сосудов, улучшению кровоснабжения и ускорению рассасывания продуктов воспаления.

Пихтоин по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Пихтоин применяют для лечения ран, ожогов, травматических повреждений тканей, экзем, дерматитов, бурситов, маститов, ушибов, папиллом и язв у животных.

9. Противопоказаний к применению Пихтоина не установлено, за исключением индивидуальной повышенной чувствительности животных к компонентам лекарственного препарата.

10. Пихтоин применяют местно, нанося тонким ровным слоем на чистую белую ткань или марлевую салфетку, которой покрывают пораженный участок тела, затем салфетку с мазью укрепляют бинтом или специальным клеем. Обработку проводят 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней.

Пихтоин можно наносить непосредственно на пораженный участок, слегка втирая его в окружающие этот участок ткани.

При ушибах и маститах Пихтоин накладывают в форме согревающих повязок. При повторной обработке Пихтоином, ранее нанесенную мазь следует удалить с поверхности обрабатываемого участка стерильной марлей.

11. Симптомов передозировки Пихтоина не установлено.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлены.

13. При пропуске одной или нескольких обработок Пихтоином применение его следует продолжить согласно инструкции.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Пихтоина в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдалось.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков раздражения кожи обработку прекращают, мазь снимают тампоном и смывают водой. Дополнительного лечения не требуется.

15. Пихтоин не назначают одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

16. Продукты животноводства во время и после применения Пихтоина используют без ограничения.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Пихтоином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Пихтоином. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ПАО завод «Ветеринарные препараты», 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, 2.

С утверждением настоящей инструкции теряет силу инструкция по применению Пихтоина, утвержденная Россельхознадзором 17 апреля 2012 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»
Регистрационное удостоверение выдано ПАО завод «Ветеринарные препараты»
Номер регистрационного удостоверения