

Диронет Джуниор суспензия для котят и щенков.

Производитель: АгроВетЗащита, Россия.

Преимущества:

- В отличие от других антигельминтиков, не снижает иммунитет животного.
- Максимально сокращает период ожидания между дегельминтизацией и вакцинацией до 7–10 дней.
- Уничтожая гельминтов способствует регенерации повреждённых ими тканей кишечника.
- Антигельминтное действие препарата проявляется только в кишечнике, поэтому препарат показан животным с заболеваниями печени и почек.
- Имеет приятный вкус мяса.

Состав и фармакологические свойства.

ДИРОНЕТ® джуниор в качестве действующих веществ содержит: пирантела памоат - 15 мг/мл и рибонуклеат натрия - 0,5 мг /мл, а также вспомогательные вещества: сахарозу, твин-80, добавку со вкусом и ароматом мяса, нипагин, нипазол и воду очищенную. Входящий в состав препарата пирантела памоат - соединение группы пиримидинов, активен в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод, механизм его действия основан на блокаде передачи нервных импульсов в нервно-мышечных синапсах путем деполяризации мембран мышечных клеток, что вызывает паралич мышечной системы нематод. Пирантела памоат практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике; выводится из организма в основном в неизменном виде (93%) с фекалиями в течение 24-48 часов. Рибонуклеат натрия ускоряет процессы регенерации травмированных нематодами клеток кишечника животного, стимулирует иммунные процессы организма, активизируя иммунокомпетентные клетки (Т- и В-лимфоциты).

Показания к применению.

ДИРОНЕТ® джуниор назначают щенкам и котят старше 3-недельного возраста, а также взрослым собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при нематодозах: токсокарозе, токсаскаридозе, унцинариозе, анкилостомозе и трихоцефалезе.

Противопоказания.

- Препарат не предназначен для дегельминтизации щенков и котят моложе 3-недельного возраста.
- Не следует применять одновременно с другими антигельминтными препаратами.
- Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп, кормами и кормовыми добавками отсутствуют.

Дозы и порядок применения.

- Применяют щенкам, котят, а также взрослым собакам и кошкам индивидуально перорально (внутрь), однократно в утреннее кормление с небольшим количеством корма или с помощью шприца-дозатора в дозе 1 мл суспензии на 1 кг массы животного.
- Перед применением суспензию следует тщательно взболтать.

- При дегельминтизации животных массой менее 0,5 кг, перед применением к отмеренной дозе препарата добавляют 0,3 мл холодной кипяченой воды, тщательно встряхивают и вводят животному внутрь на корень языка.
- Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется.
- С лечебной целью дегельминтизацию животных проводят по показаниям, с профилактической - ежеквартально в терапевтической дозе, а также за 7-10 дней перед каждой вакцинацией.

Побочные явления.

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается.

Условия хранения.

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 2°C до 25°C, недоступном для детей и животных.

Срок годности.

При соблюдении условий хранения лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона - 3 месяца. Запрещается применять по истечении срока годности.

Форма выпуска.

Полимерный флакон 15 мл со шприцем-дозатором. Внешняя упаковка – картонная коробка.