

БАРС ФОРТЕ КАПЛИ ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ

Состав и фармакологические свойства.

Препарат содержит фипронил, дифлубензурон - регулятор роста насекомых и вспомогательные вещества, в том числе эфирное масло цитронеллы. Обладает выраженной инсектоакарицидной активностью в отношении личиночных и половозрелых фаз развития блох, вшей, власоедов, иксодовых и саркоптоидных клещей, а также оказывает репеллентный эффект.

После кожного нанесения препарата входящие в его состав фипронил и дифлубензурон, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах тела животного и оказывают длительное контактное и кишечное инсектоакарицидное действие.

Механизм действия фипронила заключается в нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели насекомых и клещей. Регулятор роста насекомых нарушает синтез хитина у паразитов и таким образом разрывает их жизненный цикл.

Показания к применению.

Собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при энтомозах (вши, блохи, власоеды), саркоптозе, нотоэдрозе и поражении иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

Противопоказания.

Не подлежат обработке беременные и кормящие самки, больные инфекционными болезнями и выздоравливающие животные, щенки и котята моложе 10-недельного возраста. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

Дозы и порядок применения.

Применяют путем капельного нанесения на сухую неповрежденную кожу однократно. Продолжительность защитного действия препарата сохраняется в течение 1–2 месяцев.

Препарат наносят в места недоступные для слизывания животным: на кожу в несколько точек в области спины, между лопатками или в области шеи у основания черепа в дозах, указанных в таблице.

Минимальная терапевтическая доза препарата для собак составляет 0,18 мл/кг массы животного, что соответствует 9 мг/кг фипронила и 0,18 мг/кг дифлубензурана, для кошек – 0,1 мл/кг массы животного, что соответствует 5 мг/кг фипронила и 0,1 мг/кг дифлубензурана.

С учетом вида и массы обрабатываемого животного выбирают пипетки-капельницы необходимого объема или их комбинации и применяют препарат в дозах, указанных в таблице.

Вид животного, масса	Доза на животное: препарата, мл/действующих веществ, мг Объем/количество используемых пипеток
Капли инсектоакарицидные Барс Форте для кошек:	
до 1 кг	0,1 мл / 5 мг фипронила и 0,1 мг дифлубензурана 0,5 мл / 2 капли
от 1 до 3 кг	0,3 мл / 15 мг фипронила и 0,3 мг дифлубензурана 0,5 мл / 6 капель
от 3 кг до 10** кг	1,0 мл / 50 мг фипронила и 1,0 мг дифлубензурана 1,0 мл / 1 пипетка
Барс Форте капли для кошек против блох и клещей:	
До 1 кг	0,5 мл / 5 мг фипронила, 0,5 мг дифлубензурана 0,5 мл / 1 пипетка
Свыше 1 кг	1,0 мл / 10 мг фипронила, 1,0 мг дифлубензурана 1,0 мл / 1 пипетка

Вид животного, масса	Доза на животное: препарата, / действующих веществ, мг Объем / количество используемых пипеток
Капли инсектоакарицидные Барс Форте для собак	
до 1 кг	0,18 мл / 9 мг фипронила и 0,18 мг дифлубензурана 0,5 мл / 4 капли
от 1 до 5 кг	1,0 мл / 50 мг фипронила и 1,0 мг дифлубензурана 1,0 мл / 1 пипетка
от 5 до 10 кг	1,8 мл / 90 мг фипронила и 1,8 мг дифлубензурана 1,8 мл / 1 пипетка
от 10 до 20 кг	3,6 мл / 180 мг фипронила и 3,6 мг дифлубензурана 1,8 мл / 2 пипетки

от 20 до 30* кг	5,4 мл / 270 мг фипронила и 5,4 мг дифлубензурана	1,8 мл / 3 пипетки
-----------------	--	--------------------

При обработке собак массой более 50 кг на каждые последующие 10 кг массы дополнительно наносят по 1-й пипетке препарата.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в месяц.

В целях предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению.

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного препарат в количестве 1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20-30 минут клещ самопроизвольно не отпадает, то его аккуратно вытаскивают из тела пинцетом и уничтожают.

Не следует мыть и купать животное в природных водоемах в течение 48 часов после обработки, а также наносить препарат на влажную или поврежденную кожу.

Побочные явления.

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается.

Особые указания.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его следует тотчас смыть струей воды. Не следует гладить места нанесения препарата и подпускать животное к маленьким детям в течение 48 часов после обработки.

Хранение.

Хранить препарат в закрытой заводской упаковке, в защищенном от света и влаги, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 30°C.

Форма выпуска.

Полимерная пипетка-капельница 0,5, 1,0 и 1,8 мл. Внешняя упаковка – картонная коробка по 3 и 4 пипетки.

**) **) При обработке собак массой более 30 кг препарат применяют в дозе 0,18 мл/кг массы, при обработке кошек массой более 10 кг - в дозе 0,1 мл/кг массы животного.*