

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению препарата Профендер® для дегельминтизации кошек

(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH»;  
Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия)

Номер регистрационного удостоверения:

*276-3-6.14-2121 N17BC-3-3.6/01870*

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Профендер® (Profender®).

Международное непатентованное наименование: эмодепсид, празиквантел.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения (spot-on). Профендер® в 1 мл в качестве действующих веществ содержит эмодепсид - 21,43 мг и празиквантел - 85,75 мг, а также вспомогательные вещества: бутил-гидрооксианизол, изопропилиден глицерол и молочную кислоту.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от желтого до светло-коричневого цвета. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства.

4. Выпускают препарат Профендер® расфасованным по 0,35; 0,7; 1,12 мл в полипропиленовые пипетки соответствующей вместимости с колпачками. Пипетки по 2 штуки помещают в блистер из алюминиевой фольги и упаковывают в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С.

6. Препарат Профендер® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Препарат отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Профендер<sup>®</sup> относится к комбинированным антигельминтным лекарственным препаратам.

10. Входящие в состав препарата активные компоненты обеспечивают его широкий спектр антигельминтного действия на круглых и ленточных гельминтов, в том числе *Toxocara cati* (половозрелые особи, неполовозрелые особи, личиночные стадии L3, мигрирующие в организме и L4, паразитирующие в желудочно-кишечном тракте), *Toxascaris leonine* (половозрелые особи, неполовозрелые особи, личинки L4), *Ancylostoma tubaeforme* (половозрелые особи, неполовозрелые особи, личинки L4), *Echinococcus multilocularis* (взрослые стадии), *Dipylidium caninum* (половозрелые и неполовозрелые особи), *Taenia taeniaeformis* (взрослые стадии), *Aelurostrongylus abstrusus* (взрослые стадии), паразитирующих у кошек.

Эмодепсид является полусинтетическим соединением из группы депсипептидов, обладает выраженными нематодоцидными свойствами. Оказывая стимулирующее действие на пресинаптические латрофилиновые рецепторы, эмодепсид вызывает паралич и гибель паразита.

Празиквантел – соединение группы пиразинизохинолинов, активно в отношении желудочно-кишечных цестод на всех фазах развития. Механизм действия празиквантела заключается в деполяризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции цестод, вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель паразитов.

Фармакокинетические свойства препарата обеспечивают его хорошее всасывание из места нанесения и длительное сохранение в терапевтической концентрации в организме животного. Максимальные концентрации празиквантела и эмодепсида отмечаются в сыворотке крови через 2 - 4 суток. Выводятся соединения из организма в течение 28-30 суток: эмодепсид – в неизменном виде главным образом с фекалиями; празиквантел – в основном с мочой.

Профендер<sup>®</sup> по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и иммуно-токсического действия; хорошо переносится кошками разных пород и возраста. Препарат токсичен для рыб и других гидробионтов.

## III. Порядок применения

11. Препарат Профендер<sup>®</sup> назначают для дегельминтизации кошек с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токскариндоз, анкилостомоз, элюростронгилез) и цестодозах (тенидозы, дипилидиоз, эхинококкозы).

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Профендер<sup>®</sup> не сле-

дует применять котятм моложе 8-недельного возраста и/или массой менее 0,5 кг. Препарат не следует наносить на влажную или поврежденную кожу.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом..

14. Препарат Профендер® разрешен к применению во время беременности и в период лактации. Не следует применять Профендер® котятм моложе 8-недельного возраста и/или массой менее 0,5 кг.

15. Препарат применяют наружно, путем топикального (spot-on) нанесения на кожу. Перед использованием с пипетки снимают защитный колпачок и, расположив ее вертикально, прокалывают защитную мембрану носика пипетки (надев колпачок с обратной стороны), затем колпачок снова снимают. Препарат, раздвинув шерсть, наносят в места, недоступные для слизывания, непосредственно на кожу между лопатками у основания шеи.

При обработке крупных кошек содержимое пипеток наносят на кожу в области шеи в несколько мест, недоступных для слизывания животным.

Минимальная терапевтическая доза препарата Профендер® составляет 0,14 мл/кг массы животного.

Дегельминтизацию кошек с использованием препарата Профендер® проводят, начиная с 8-недельного возраста, в дозах, указанных в таблице:

Масса кошки, кг	Маркировка и объем используемых пипеток, мл
от 0,5 до 2,5	Профендер® для маленьких кошек - 0,35
от 2,5 до 5,0	Профендер® для средних кошек - 0,7
от 5,0 до 8,0	Профендер® для крупных кошек -1,12

При обработке кошек массой более 8 кг Профендер® применяют из расчета 0,14 мл на каждый кг массы животного, используя комбинации пипеток различной фасовки.

Дегельминтизацию кошек с лечебной целью проводят однократно, с профилактической – ежеквартально в терапевтической дозе. Для лечения элуростронгилеза (взрослые стадии *Aelurostrongylus abstrusus*) препарат Профендер® следует применять двукратно с интервалом 14 дней.

В целях предотвращения лактогенной передачи (через молоко) *Toxocara cati* (личинки L3) от матери котятм эффективна однократная обработка беременной кошки препаратом Профендер® примерно за семь дней до предполагаемой даты родов.

Время, необходимое для всасывания препарата, составляет около 2 часов. По истечении этого времени место нанесения препарата, в случае необходимости, можно мыть.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

В редких случаях (более 1, но менее чем у 10 особей из 10 000 животных) возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд). В очень редких (менее чем у 1 особи из 10 000 животных) случаях могут возникать слюнотечение и рвота, а так же возможны неврологические расстройства легкой формы, такие как атаксия и тремор. Было установлено, что эти эффекты возникают вследствие облизывания кошкой места нанесения препарата непосредственно после обработки препарата и самопроизвольно проходят без применения лекарственных средств.

17. При передозировке препарата у некоторых кошек могут наблюдаться: повышенная саливация, рвота, тремор. Было установлено, что эти симптомы возникают в результате облизывания кошкой места нанесения препарата и самопроизвольно проходят без применения лекарственных средств.

18. Не следует применять Профендер® одновременно с другими антигельминтными лекарственными препаратами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

21. Препарат Профендер® не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany)

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «БАЙЕР»  
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул.,  
18, стр. 2;  
тел. (495) 234-2000

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Профендер®, утвержденная Россельхознадзором 30.07. 2014 года.