

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н. А. ВЛАСОВ
22 АВГ 2018

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Дронтал® плюс.

(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH»
Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-21.13-3032 ЗМВУ-3-0.2/01478

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Дронтал® плюс (Drontal® plus).

Международные непатентованные наименования действующих веществ:
пирантел, празиквантел, фебантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Лекарственный препарат Дронтал® плюс выпускают в двух дозировках, со-
держащих в качестве действующих веществ в 1 таблетке, рассчитанной на 10 кг
массы животного: пирантел эмбонат - 144 мг, празиквантел - 50 мг и фебантел
– 150 мг, в 1 таблетке, рассчитанной на 35 кг массы животного: пирантел эм-
бонат - 504 мг, празиквантел - 175 мг и фебантел – 525 мг, а также вспомога-
тельные вещества: лактозы моногидрат, микрокристаллическую целлюлозу,
крахмал кукурузный, поливидон, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, крос-
кармеллозу натрия, кремний коллоидный безводный и пищевую добавку со
вкусом мяса.

3. По внешнему виду Дронтал® плюс 1 таблетка на 10 кг представляет со-
бой таблетку в форме кости от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
с разделительной бороздкой по центру.

По внешнему виду Дронтал® плюс 1 таблетка на 35 кг представляет собой
таблетку в форме кости от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с
разделительной бороздкой по центру.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства. Запрещается применение препарата Дронтал® плюс по истечении срока годности.

4. Таблетки Дронтал® плюс фасуют в блистеры по 2 и 6 таблеток, которые упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят Дронтал® плюс в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Препарат Дронтал® плюс следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Дронтал® плюс относится к фармакотерапевтической группе антигельминтных препаратов в комбинациях.

10. Дронтал® плюс обладает широким спектром антигельминтного действия в отношении круглых, ленточных гельминтов и простейших рода лямблий, паразитирующих у собак, включая *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trihuris vulpis*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.*, *Giardia spp.*

Механизм действия фебантела, входящего в состав лекарственного препарата, основан на нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции паразита, ингибировании фумаратредуктазы и синтеза АТФ, повышении проницаемости клеточных мембран, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу, гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта.

Пирантела эмбонат оказывает выраженное нематоцидное действие, вызывая повышение проницаемости клеточных мембран, необратимый паралич и контрактуру мышц у нематод, что приводит к гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта. Пирантела эмбонат и фебантел частично всасываются в кишечнике и выводятся из организма в основном с фекалиями в течение 24-48 часов.

Механизм действия празиквантара заключается в деполяризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и микротурбулярной функции у цестод, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу и гибели паразита. Празиквантер быстро всасывается в кишечнике и

распределяется во внутренних органах и тканях; выводится из организма с мочой в основном в метаболизированной форме.

Дронтал® плюс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия. Хорошо переносится собаками разных пород и возрастов.

III. Порядок применения

11. Дронтал® плюс назначают собакам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез) и цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы, мезоцестидоз) и гиардиозе (лямблиозе).

12. Противопоказанием к применению препарата Дронтал® плюс является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Не следует применять препарат животным массой менее 2 кг.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. Пустые блистеры и коробки из-под препарата утилизируют с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом Дронтал® плюс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Дронтал® плюс не следует назначать щенкам первые две трети периода беременности и щенкам моложе 2-х недельного возраста. Препарат разрешен к применению в период лактации.

15. Дронтал® плюс применяют собакам индивидуально однократно из расчета 1 таблетка в форме кости на 10 кг массы животного или 1 таблетка в форме кости на 35 кг массы животного. Дозы препарата указаны в таблице:

| Масса собаки | Дозировка препарата Дронтал® плюс |
|--------------|-----------------------------------|
| | 1 таблетка на 10 кг |

| Щенки и собаки маленьких пород | | |
|--------------------------------|--|------------|
| 2 - 5 кг | | ½ таблетки |
| 5 - 10 кг | | 1 таблетка |
| Собаки средних пород | | |
| 10-20 кг | | 2 таблетки |
| 20-30 кг | | 3 таблетки |
| Собаки крупных пород | | |
| 30-40 кг | | 4 таблетки |
| 40-50 кг | | 5 таблеток |

Для собак массой более 50 кг применяется дозировка из расчета 1 таблетка на 10 кг массы животного.

| Масса собаки | Дозировка препарата Дронтал® плюс |
|--------------|-----------------------------------|
| | 1 таблетка на 35кг |
| 10-17,5 кг | ½ таблетка |
| 17,5-35 кг | 1 таблетка |
| 35-52,5 кг | 1½ таблетки |
| 52,5-70 кг | 2 таблетки |

Для собак массой более 70 кг применяется дозировка из расчета 1 таблетка на 35 кг массы животного.

Благодаря вкусовой добавке, препарат хорошо поедается собаками. С лечебной целью животных дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью - ежеквартально в терапевтической дозе. Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

При лечении лямблиоза препарат применяют в рекомендованных дозах в течение 3-х дней подряд.

При дегельминтизации собак рекомендуется проводить дезинфекцию и дезинвазию мест содержания животных во избежание повторного заражения.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны повышенная саливация, диарея или рвота. Указанные симптомы кратковременны, самопроизвольно исчезают и не требуют применения лекарственных средств.

17. Симптомы передозировки не установлены.

18. Дронтал® плюс не следует применять одновременно с препаратами, содержащими пиперазин, ввиду возможных антагонистических эффектов.

19. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков дегельминтизации. При пропуске очередной обработки лекарственный препарат необходимо ввести как можно скорее в предусмотренной данной инструкцией дозе.

21. Дронтал® плюс не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany).

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО “БАЙЕР”
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул.,
18, стр. 2;
тел. (495) 234-2000

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Дронтал® плюс утвержденная Россельхознадзором 20.03.2018 года.