

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Фиприста® Спот Он
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек

(организация-разработчик АО «КРКА, д.д., Ново место»/ «KRKA, d.d., Novo mesto»,
Šmarješka cesta 6, 8501, Novo mesto, Slovenija)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Фиприст® Спот Он (Fiprist® Spot On).

Международное непатентованное наименование: фипронил.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Фиприст Спот Он в качестве действующего вещества содержит фипронил – 100 мг в 1 мл, а в качестве вспомогательных веществ - повидон, полисорбат, бутилгидроксианизол, бутилгидротолуен и диметилсульфоксид.

3. По внешнему виду Фиприст® Спот Он представляет собой прозрачный раствор желтоватого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают Фиприст® Спот Он расфасованным по 0,5; 0,67; 1,34; 2,68; 4,02 мл в полиэтиленовые пипетки, помещенные поштучно в пакеты из алюминиевой фольги. Пипетки упаковывают в картонные пачки по три штуки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °C до 25 °C.

6. Фиприст® Спот Он следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства. При уничтожении неиспользованного препарата не следует допускать его попадания в природные водоемы и источники питьевой воды.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства.

9. Фиприст® Спот Он – инсектоакарицидный лекарственный препарат контактного действия.

10. Фиприст® Спот Он активен в отношении:

- половозрелых фаз развития блох *Ctenocephalides spp.*;
- власоедов *Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*;
- иксодовых клещей (все фазы развития) *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes spp.*, *Haemaphysalis spp.*;
- вшей *Linognathus setosus*;

- саркоптоидных клещей *Sarcoptes scabiei var. canis*;
- комаров *Aedes aegypti*;
- ушных клещей *Otodectes cynotis*.

Механизм действия фипронила, входящего в состав препарата, заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

После нанесения препарата на кожу фипронил в течение 24 часов постепенно распределяется по всей поверхности тела и, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывая длительное контактное инсектоакарицидное действие, обеспечивает защиту животного от эктопаразитов. Однократная обработка животного обеспечивает уничтожение блох и клещей в течение 24 и 48 часов соответственно.

Фиприст® Спот Он по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Фиприст® Спот Он назначают собакам и кошкам с 8-недельного возраста при энтомозах, отодектозе, поражении клещами (иксодовыми, хейлителлами), а также в комплексной терапии аллергического дерматита, вызываемого блохами.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к ингредиентам препарата (в том числе в анамнезе). Запрещается применение Фиприста® Спот Он больным инфекционными болезнями и ослабленным животным, собакам массой менее 2 кг, кошкам массой менее 1 кг.

Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной чесотке) при прободении барабанной перепонки.

13. Фиприст® Спот Он применяют животным путем однократного топикального нанесения на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки различной фасовки (в зависимости от вида и массы животного).

Перед обработкой кончик пипетки прокалывают перевернутым колпачком, раздвигают у животного шерсть в области спины (между лопатками) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в одну или несколько точек в следующих дозах:

Вид животного, масса (кг)	Объем используемой пипетки (мл)/содержание фипронила (мг)	Количество пипеток
Собаки:		
2-10	0,67/67	1
10-20	1,34/134	1
20-40	2,68/268	1
свыше 40	4,02/402	1
Кошки		
	0,5/50	1

При обработке собак массой более 60 кг используют комбинацию пипеток разного объема.

Продолжительность защитного действия препарата против иксодовых клещей после обработки кошек составляет до 4 недель, после обработки собак – до 5 недель; продолжительность защитного действия против блох после обработки кошек – до 5 недель, после обработки собак от 4 до 12 недель.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в четыре недели.

В целях предотвращения повторной инфекции животных блохами рекомендуется обрабатывать всех кошек и собак, обитающих совместно, а также заменить подстилки или обработать их инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению. Для лечения отодектоза Фиприст[®] Спот Он закапывают в каждое ухо по 4-6 капель (капли обязательно вводят в оба уха). Для равномерного распределения препарата ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание. Остаток препарата в используемой пипетке (в расчете на массу животного), наносят на кожу между лопаток (однократная обработка).

При осложнении отодектоза отитом назначают противомикробные и противовоспалительные средства.

Не следует мыть и купать животное в природных водоемах в течение 48 часов после обработки, а также наносить препарат на влажную или поврежденную кожу.

14. При значительной передозировке у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Препарат разрешается применять животным, предназначенным для разведения, а также беременным и лактирующим самкам. Запрещается применение Фиприста[®] Спот Он щенкам и котятам моложе 8-недельного возраста.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. Очень редко на месте нанесения препарата возможно склеивание шерсти, слабо выраженная реакция кожи (зуд, выпадение шерсти, покраснение кожи). При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций, препарат следует смыть водой с мылом или зоошампунем и при необходимости провести десенсибилизирующую терапию.

19. Фиприст[®] Спот Он не следует применять совместно с другими инсектоакарцидными средствами для обработки животных.

20. Фиприст[®] Спот Он не предназначен для обработки продуктивных животных.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Фипристом[®] Спот Он следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством. В течение 24 часов после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

22. Не следует допускать к работе с препаратом лиц с признаками аллергических, респираторных и кожных заболеваний. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата необходимо избегать прямого контакта с Фипристом[®] Спот Он.

23. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его следует тотчас снять тампоном и затем смыть водой с моющим средством; при попадании внутрь – дать выпить несколько стаканов теплой воды, энтеросорбент и при необходимости обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь этикетку или инструкцию по применению).

Наименования и адреса производственных площадок производителя препарата

АО «КРКА, д.д., Ново место»/«KRKA, d.d., Novo mesto»,

1. Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija;
2. Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenija.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

Представительство АО «КРКА, д.д., Ново место» в РФ,

125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1

Тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91.

Номер регистрационного удостоверения 705-3-1415-3012 НПВ4-3-8.0/032 72

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Фиприста® Спот Он, утвержденная Россельхознадзором 19.02.2016 г