

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки ПреноКан® для нормализации работы желудочно-кишечного тракта у собак (организация-производитель ООО «Витамер», г. Москва)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ПреноКан® (PrenoCan) – кормовая добавка для нормализации работы желудочно-кишечного тракта у собак.
  2. В состав ПреноКан® входят экстракт лапок пихты очищенный – не менее 1,0 мг и лактоза пищевая – до 1 г. В качестве действующего вещества содержит полипренолы – не менее 0,05 %.
- Кормовая добавка ПреноКан® не содержит генно-инженерно модифицированных продуктов.
3. По внешнему виду представляет собой однородный микрокристаллический порошок от белого до светло-жёлтого цвета.
  4. Выпускают расфасованным по 125, 350, 450 и 650 г в полимерные банки.
- Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: организации производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения, способа применения, массы нетто, состава и гарантированных показателей, сведений о соответствии, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, обозначения СТО, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.
- Хранят в закрытой упаковке организации-производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 25°C.
- Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.
- Кормовая добавка ПреноКан® не должна применяться по истечении срока хранения.

### II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Содержащийся в ПреноКане® экстракт лапок пихты очищенный содержит целый ряд ценных, участвующих в жизненно важных процессах и необходимых организму веществ, таких как жирорастворимые витамины и провитамины, каротиноиды, токоферолы и витамины группы К, сквален, полипренолы и фитостеринны и др. Полипренолы и их фосфаты выполняют мембранообразующую роль и определяют текучесть мембран, участвуют в обмене белков и углеводов в клетке, защищают от ультрафиолетового излучения, свободных радикалов.
- ПреноКан® стимулирует рост собственной полезной микрофлоры в кишечнике и повышает ее устойчивость к неблагоприятным факторам; оптимизирует процессы пищеварения и обмен веществ; повышает устойчивость слизистых оболочек к патогенным факторам; защищает и укрепляет клеточные мембраны.

### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

6. Кормовую добавку ПреноКан® применяют беременным и кормящим сукам, щенкам в период отъема, стареющим, ослабленным и выздоравливающим собакам для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.
7. Дают 1–2 раза в день, добавляя в корм или в воду для поения в следующих дозах:

<b>Живая масса собак</b>	<b>Дозы</b>
Собаки до 5 кг	1/3–1/2 чайной ложки (2–3 г)
Собаки от 5 до 12 кг	1/2–2/3 чайной ложки (3–4 г)
Собаки от 12 до 25 кг	2/3–1 чайная ложка (4–6 г)
Собаки от 25 до 45 кг	1/2 столовой ложки (10 г)
Собаки свыше 45 кг	1 столовая ложка (20 г)

Продолжительность курсового приема 4–6 недель.

При необходимости длительность курса и кратность приема можно увеличить.

8. При применении кормовой добавки ПреноКан® в рекомендуемых дозах побочных явлений и осложнений у животных не выявлено.

9. Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Противопоказанием к применению кормовой добавки ПреноКан® является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам кормовой добавки.

### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. При работе с ПреноКаном® следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

12. Хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана ООО «ГамаВетФарм» (г. Москва).

Адрес организации-производителя: ООО «Витамер», 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер., д. 1, пом. III.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВР-2-11.15/03250

Генеральный директор

ООО «ГамаВетФарм» Ю.П. Богданов